

ISAPS 的 2020 年全球調查顯示疫情期間美容手術發生重大變化

2019 冠狀病毒病診所關閉導致外科手術減少 10.9%

新罕布什爾州西黎巴嫩2021年12月28日 /美通社/ -- 國際美容整形外科學會 (ISAPS) 今天發佈其年度全球美容／美容手術調查結果，顯示 2020 年 2019 冠狀病毒病疫情對全球美容整形手術的影響。



重點一覽

2020 年，美容整形外科手術整體減少了 10.9%，全球 77.8% 的外科醫生在 2019 冠狀病毒病疫情期間曾臨時關閉診所。非手術（主要是填充劑和脫毛治療）繼續增加，但比例低於往年（2020 年為 5.7%，而 2019 年為 7.6%）。這導致所有手術整體減少了 1.8%。

ISAPS 全球調查委員會主席 Arturo Ramirez-Montañana 博士表示：「這種下降趨勢與我們的調查結果一致，即在 2019 冠狀病毒病疫情期間，由於安全和財務問題，患者需求下降。與此同時，由於患者的靈活性增加、更私密的康復機會，特別是面部手術，即所謂的『縮放效應』，我們當中許多人也遇到需求增加。這限制了 2019 冠狀病毒病對整體程序的影響。」

美容程序

全球最常見的外科手術在 2020 年保持不變，隆胸佔所有手術的 16%、抽脂手術 15.1%、眼瞼手術 12.1%、鼻整形術 8.4% 和腹部整形術 7.6%。

排名前五的非手術程序也保持一致：肉毒桿菌毒素（佔所有非手術程序的 43.2%）、透明質酸（28.1%）、脫毛（12.8%）、非手術減脂（3.9%）和光子嫩膚（3.6%）。大約 85% 的非手術程序是在女性身上進行。

儘管手術整體減少，但隆鼻和提眉手術繼續增加，非手術面部再生程序與 2019 年和 2018 年的下降相比增加了 13.9%。

整體而言，除肉毒桿菌毒素、透明質酸和微燒蝕換膚術（分別減少 0.9%、6.1% 和 11.3%）外，非手術程序有所增加。

男性最常見的外科手術仍然是眼瞼手術、抽脂、男性乳房發育症、隆鼻和耳部手術。

從不同手術的年齡分佈來看，19-34 歲人士在隆鼻手術所佔比例最高（67.9%），而 35-50 歲人士則佔肉毒桿菌毒素手術的大多數（50.2%）。

在進行本調查時，只有 45% 的外科醫生留意到患者人數已恢復至疫情前狀況。ISAPS 博士說：「儘管我們正在經歷可怕的疫情，但似乎大多數美容整形外科醫生的業務正在恢復至接近正常，我對 2021 年抱持樂觀態度，無論是整形外科行業還是外科和非外科手術。」

國家統計資料

美國的外科和非外科手術均有所增加，鞏固其作為全球外科手術第一國（佔外科手術總數的 14.7%）的地位，並在全球進行的大多數非手術程序（佔非手術程序總數的 22.1%）領先於巴西。

2020 年手術量排名前 10 位的國家是美國、巴西、德國、日本、土耳其、墨西哥、阿根廷、意大利、俄羅斯和印度，其次是西班牙、希臘、哥倫比亞和泰國。

墨西哥、土耳其和哥倫比亞的外國患者比例最高：2020 年分別為 28.2%、25.8% 和 21.8%。去年排名第一的泰國排名第四，為 20.9%。

醫院仍然是進行外科手術的主要設施（全球 43.8%），除了美國更常用診所設施（佔手術的 45%）和獨立手術中心（34.3%）。

調查方法

調查參與者完成一份問卷，主要關注 2020 年進行的特定手術和非手術程序的數量，以及一些與 2019 冠狀病毒病的影響、外科醫生人口統計數據和醫療旅遊流行相關的輔助問題。問卷發送給 ISAPS 數據庫中大約 25,000 名整形外科醫生。本調查共收集了 1,081 名整形外科醫生的數據。結果由位於俄亥俄州哥倫布的獨立研究公司 Industry Insights 編制、製造圖表和分析。ISAPS 是唯一一家每年在全球收集此類化妝品數據的組織。如需完整結果的副本，請瀏覽 <https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/>。

關於 ISAPS – 國際美容整形外科學會 (ISAPS) 是世界領先的專業機構，由董事會認證的美容整形外科醫生組成。ISAPS 成立於 1970 年，為全球美容整形外科知識交流提供一個開放的討論區。ISAPS 贊助和支持世界各地的科學會議，並為其成員提供最新的培訓和持續教育。今天，ISAPS 會員包括來自 110 個國家／地區的 5,100 多名世界最受尊敬的美容和重建外科醫生。尋找美容整形外科醫生的患者可以使用我們的[尋找外科醫生](#)功能來尋找合格、經驗豐富且對道德實踐和患者安全有明確承諾的外科醫生。

聯絡電郵：media@isaps.org