Nuevo informe sobre estética global: La cirugía de párpados, la liposucción y el aumento de pecho se sitúan entre las intervenciones quirúrgicas más demandadas

Más de 35 millones de intervenciones estéticas en 2025.

- **.Descarga el informe de la encuesta global (isaps-global-survey_2025.pdf)**

LEBANON, N.H., 29 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- **La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS)** ha publicado hoy los resultados de su encuesta **anual sobre procedimientos estéticos y cosméticos**, que revelan que se han realizado casi 17,9 millones de intervenciones quirúrgicas a cargo de cirujanos plásticos y 17,3 millones de procedimientos no quirúrgicos. En los últimos cuatro años, el incremento total ha sido del 9,2 %.



La cirugía de párpados vuelve a ser la intervención quirúrgica más habitual, seguida de la liposucción, el aumento de pecho, el lifting de pecho y la abdominoplastia. Los tratamientos no quirúrgicos más populares fueron la toxina botulínica, el ácido hialurónico (relleno), el tensado cutáneo no quirúrgico y la depilación.

Las intervenciones en la cara y la cabeza registraron un crecimiento a partir de 2024, con más de 7,6 millones de intervenciones y un aumento del 3,2 %. Las intervenciones más frecuentes fueron la cirugía de párpados, con más de 2,4 millones de intervenciones; la rinoplastia, con más de 1 millón; y el injerto de grasa (en la cara), con 0,9 millones de intervenciones. Se realizaron 4,7 millones de intervenciones mamarias (+5,7 %) y 5,4 millones de intervenciones en el tronco y las extremidades (-8,9 %).

Por primera vez, la cirugía de párpados fue la intervención quirúrgica más habitual entre las mujeres y entre los hombres, seguida del aumento de pecho y la liposucción en el caso de las mujeres, y de la ginecomastia y la rinoplastia en el de los hombres. El 85,6 % de todos los procedimientos quirúrgicos y el

84,8 % de los no quirúrgicos se realizaron en mujeres, mientras que el 14,4 % de los quirúrgicos y el 15,2 % de los no quirúrgicos se realizaron en hombres.

La mayoría de los aumentos de pecho (49,5 %), las cirugías genitales externas —de todo tipo— (45,2 %), y las rinoplastias (57 %) se realizaron en mujeres de entre 18 y 34 años, mientras que las inyecciones de toxina botulínica (47 %) y la liposucción (44 %) fueron más populares entre las mujeres de entre 35 y 50 años. La reducción de grasa sin cirugía se distribuyó de forma bastante uniforme entre ambos grupos de edad.

La toxina botulínica siguió siendo el procedimiento no quirúrgico más habitual entre los hombres y las mujeres —en todos los grupos de edad—, con 7,3 millones de intervenciones realizadas por cirujanos plásticos en todo el mundo. En segundo lugar se situaron los tratamientos con ácido hialurónico (relleno), con 4,7 millones.

Una vez más, Estados Unidos fue el país que realizó más intervenciones, con más de 5,4 millones (el primero en intervenciones no quirúrgicas, con más de 3,2 millones), seguido de Brasil, con 3,2 millones (el primero en intervenciones quirúrgicas, con 2,3 millones), y China (2,8 millones). En promedio, los países con mayor proporción de pacientes extranjeros son la República Dominicana, Túnez y México.

El Dr. Amin Kalaaji, presidente del Comité de Encuestas Globales de la ISAPS y cirujano plástico en Noruega, afirmó: *«La encuesta pone de relieve cambios importantes en 51 mercados internacionales, encabezados por la mastopexia (elevación de mamas), que registró el mayor incremento porcentual con un aumento del 48 %, mientras que la cirugía de párpados generó el mayor crecimiento numérico global entre los procedimientos quirúrgicos. Por el contrario, observamos un descenso significativo en los tratamientos no quirúrgicos, sobre todo una reducción del 25 % en las inyecciones de ácido hialurónico, tanto en hombres como en mujeres».*

Seguridad del paciente

El Dr. Naveen Cavale, presidente del Comité de Comunicación de la ISAPS y cirujano plástico en el Reino Unido, afirmó: «*Aunque se trate de una intervención electiva, la cirugía estética es una intervención quirúrgica real que conlleva riesgos y posibles efectos secundarios. La seguridad debe ser la prioridad, por lo que animamos a los pacientes a que elijan a un* ***cirujano plástico especializado y certificado por la Junta*** *de la de Estados Unidos, con formación y experiencia en este procedimiento».*

Acerca de la ISAPS – La Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS) es la principal organización profesional a nivel mundial que agrupa a cirujanos plásticos estéticos certificados por la junta , cuya misión es inspirar y fomentar la formación en cirugía estética en todo el mundo® para garantizar la seguridad de los pacientes.

Para obtener una copia de los resultados de la encuesta, visita www.isaps.org/discover/media-centre

Para consultar las directrices para pacientes, visita
www.isaps.org/discover/patients-home

Para consultas de los medios de comunicación: media@isaps.org.