

Novo relatório de estética global: uma mudança em direção à cirurgia facial globalmente, pois a pálpebra é o procedimento mais importante

Procedimentos estéticos próximos de 38 milhões em 2024.

MOUNT ROYAL, N.J., 20 de junho de 2025 /PRNewswire/ -- A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) divulgou os resultados de sua Pesquisa Global anual sobre Procedimentos Estéticos/Cosméticos no Congresso Mundial de Olimpíadas da ISAPS em Singapura, mostrando mais de 17,4 milhões de procedimentos realizados por cirurgões plásticos e 20,5 procedimentos não cirúrgicos. Nos últimos quatro anos, o aumento geral foi de 42,5%.

Procedimentos Estéticos

A cirurgia de pálpebras, pela primeira vez, foi o procedimento cirúrgico mais comum em 2024, substituindo a lipoaspiração, com 2,1 milhões, seguida pela lipoaspiração, aumento de mama, revisão de cicatrizes e rinoplastia. Os procedimentos não cirúrgicos mais populares foram toxina botulínica, ácido hialurônico (preenchimento), remoção de pelos, endurecimento da pele não cirúrgico e peelings químicos.

A maioria dos procedimentos de face e cabeça apresentou crescimento em relação ao ano anterior, com mais de 7,4 milhões de procedimentos e aumento de 4,3%. Os principais procedimentos foram cirurgia de pálpebras com mais de 2,1 milhões e um aumento de 13,4%, rinoplastia com 1 milhão de procedimentos e uma diminuição de 10% e enxerto de gordura – face 0,9 milhão e um aumento de 19,2%. Foram 3,9 milhões de procedimentos de mama (-14,1%) e 6 milhões de procedimentos de corpo e extremidades (-14,8%).

A lipoaspiração ainda era o procedimento cirúrgico mais comum para as mulheres, seguido pela cirurgia palpebral e pelo aumento mamário. A cirurgia da pálpebra foi novamente o procedimento cirúrgico mais popular entre os homens, seguido pela ginecomastia e revisão da cicatriz.

A maioria dos aumentos mamários (54% do total), rinoplastias (60,1%) e cirurgia genital externa (48,4%) ocorreu em pessoas de 18 a 34 anos, enquanto os injetáveis de toxina botulínica foram mais populares entre as pessoas de 35 a 50 anos (47,0% do total). A lipoaspiração e a redução de gordura não cirúrgica foram distribuídas de forma bastante uniforme entre as duas faixas etárias.

A toxina botulínica continuou sendo o procedimento não cirúrgico mais comum para homens e mulheres e entre todas as faixas etárias, com 7,8 milhões de procedimentos realizados por cirurgões plásticos em todo o mundo. Em segundo lugar, os procedimentos com ácido hialurônico aumentaram 5,2%, para 7,8 milhões.

Comentando os resultados globais, o Dr. Amin Kalaaji, presidente do Comitê de Pesquisa Global da ISAPS e cirurgião plástico na Noruega, disse: "Nosso relatório agora inclui dados sobre 'Mommy Makeover' e outros procedimentos combinados, revisão de cicatrizes, rejuvenescimento das mãos com enxerto de gordura, remoção de gordura bucal, correção de mamilo invertido, criação de covinhas e outras cirurgias genitais externas".

Mais uma vez, os EUA realizaram a maioria dos procedimentos com mais de 6,1 milhões, seguidos pelo Brasil com 3,1 milhões (que é o primeiro em procedimentos cirúrgicos) e pelo Japão.

Para consultas da mídia, entre em contato com media@isaps.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2714501/ISAPS_Global_Survey_2024.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1038963/ISAPS_Logo.jpg